


Инструкция по применению препарата Zepatier

Зепатир – это новое лекарство, доказавшее в ходе клинических испытаний свою высокую эффективность в лечении гепатита С генотипов 1 и 4.



Зепатир (Zepatier) – это комбинированный препарат, содержащий в себе фиксированные дозы элбасвира и grazопревира. Они представляют собой противовирусные препараты, обладающие способностью останавливать размножение вируса гепатита С в организме человека.

Зепатир используется для лечения гепатита С 1 или 4 генотипа у взрослых пациентов. В некоторых случаях Зепатир принимается в комбинации с другим противовирусным препаратом рибавирин (торговые названия – Копегус, Ребетол, Модериба, Рибосфера).

Зепатир применяется только тем пациентам, у которых вирус гепатита С имеет специфический генетический маркер. Его можно определить с помощью процедуры генотипирования.

Преимущество Зепатира как самостоятельного препарата и в комбинации с рибоварином заключается в его высокой эффективности против вирусов гепатита С генотипов 1 и 4, в том числе у пациентов с компенсированным циррозом печени и тяжелыми болезнями почек.

Форма выпуска и состав

Зепатир выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, каждая из которых содержит 50 мг элбасвира и 100 мг grazопревира.

Механизм действия

Зепатир содержит в себе два прямых противовирусных агента с различными механизмами действия. Элбасвир является ингибитором вирусного белка NS5A, который играет важную роль в репликации РНК и сборке вириона вируса гепатита С. Гразопревир относится к классу ингибиторов NS3 / 4A протеазы, необходимой для протеолитического расщепления и имеющей большое значение для репликации вируса.

Показания

Зепатир назначается для лечения взрослых пациентов, страдающих вирусом гепатита С 1 и 4 генотипа.

Противопоказания

- Зепатир противопоказан пациентам с умеренной или тяжелой печеночной недостаточностью в связи с ожидаемым значительным увеличением гразопревира в плазме и повышенным риском резкого повышения уровня аланинаминотрансферазы.

- При совместном применении с рибавирином пациенты должны учитывать противопоказания к лечению рибавирином.

- Одновременное применение с некоторыми лекарственными средствами (например, ингибиторами органического анион-транспортующего полипептида [OATP] 1B1 и 1B3, мощными индукторами CYP3A, эфавиренцом.

Побочные эффекты

Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если после приема Зепатира у вас появились признаки аллергической реакции, такие как отек лица, шеи, губ, языка и затрудненное дыхание.

Проконсультируйтесь со своим врачом, если в ходе лечения Зепатиром у вас появились следующие проблемы:

- тошнота, боль в верхней части живота, потеря аппетита;
- хроническая усталость;
- потемнение мочи и светлый цвет кала;
- желтуха – пожелтение склер глаз и кожных покровов;
- при принятии Зепатира в комбинации с рибавирином: бледность кожи, затрудненное, отрывистое дыхание, учащенное сердцебиение, проблемы с концентрацией внимания.

Общими побочными эффектами Зепатира являются:

- головная боль;
- тошнота;
- диарея;
- проблемы со сном;
- хроническая усталость.

Взаимодействие с другими препаратами

Элбасвир и Гразопревир могут взаимодействовать со многими лекарственными средствами. Расскажите своему врачу обо всех принимаемых вами лекарствах, в том числе и витаминах и биологических добавках, особенно если это:

- бозентана;
- модафинил;
- такролимус;
- антибактериальные или противогрибковые препараты;
- противовирусные препараты, предназначенные для лечения ВИЧ/СПИДа;
- лекарства, нормализующие уровень холестерина в крови;
- лекарства, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- противотуберкулезные препараты.

Способ приема и дозировка

Зепатир выпускается в форме бежевых таблеток в пленочном покрытии. Их необходимо принимать один раз в день вместе с пищей или без нее. Длительность лечения составляет 12 или 16 недель в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и определяется лечащим врачом. В некоторых случаях при приеме Зепатира дополнительно назначается рибаверин по одной таблетке два раза в день.

Никогда не принимайте двойную дозу препарата. Если вы забыли выпить таблетку, пропустите день и начните принимать Зепатир по предписанной схеме.

Зепатир выпускается в блистерной упаковке по 14 таблеток. Каждая таблетка индивидуально упакована, что защищает ее от воздействия влаги. В ходе лечения храните таблетки в оригинальной упаковке, не пересыпайте их в другие флаконы.